

FSH recombinante (Gonal-F)

Qu'est-ce que la FSH recombinante ?

La [FSH](#) vous a été prescrite pour permettre le recrutement et la maturation de vos [follicules ovariens](#).

La [FSH](#), appelée aussi hormone folliculo-stimulante, est une hormone sécrétée par l'[hypophyse](#) (une glande située au niveau du cerveau).

La Gonal-F est fabriquée par ingénierie génétique.

Mode d'utilisation

Gonal-F s'administre par **injection sous-cutanée, toujours aux mêmes heures.**

Le nombre d'injection dépendra de la dose prescrite, soit une injection par jour si votre dose est de moins de 450 unités et deux injections par jour (le matin et le soir) si la dose dépasse 450 unités.

La dose de Gonal-F varie selon le protocole choisi et selon votre profil.

La durée de traitement varie selon votre réponse au traitement, soit la maturation de vos [follicules ovariens](#).

Votre réponse au traitement est évaluée par des dosages hormonaux, faits par prises de sang, et des échographies.

Votre infirmière vous expliquera comment préparer et vous administrer Gonal-F. Elle vous remettra également un [feuillelet conseils d'administration pour l'injection sous-cutanée](#).

Référez-vous au calendrier qui vous a été expliqué par l'infirmière pour connaître la dose que vous devez vous administrer ainsi que le nombre d'administrations.

Dose oubliée ou surdosage : Contactez votre professionnel de santé du CPA

Si vous oubliez ou manquez une dose, contactez immédiatement l'infirmière de la clinique. Il se pourrait que vous deviez suspendre votre cycle et reprendre le traitement au cycle suivant.

En aucun cas vous ne devez doubler la dose sans que votre médecin ne vous l'ait précisé.






Effets secondaires

Gonal-F est généralement bien tolérée.

Vous pourriez présenter des maux de tête, des crampes abdominales, de la sensibilité des seins, des bouffées de chaleur, des nausées, un gonflement abdominal, une rougeur au site d'injection qui persiste en général 24 heures. Parlez-en à votre professionnel de la santé s'ils vous incommode.

Ce traitement peut **rarement** entraîner un [syndrome d'hyperstimulation ovarienne](#) (SHO). Afin de le prévenir, un suivi étroit sera effectué. Toutefois, il est important de reconnaître les signes de gravité.

Contactez d'urgence votre médecin si vous ressentez :

-  **Douleur abdominale sévère.**
-  **Nausées, diarrhées, vomissements sévères.**
-  **Gain rapide de poids et augmentation importante du périmètre abdominal.**
-  **Essoufflement au repos ou difficultés respiratoire.**
-  **Diminution du volume des urines.**

Les grossesses multiples et la formation de kystes ovariens sont possibles. Un suivi échographique sera effectué afin de les prévenir.

Rarement, des caillots de sang dans les jambes peuvent survenir. Si vous avez des antécédents personnels ou familiaux, des facteurs de risques connus, parlez-en à votre médecin.

Interactions

Gonal-F ne présente pas d'interactions connues avec d'autres médicaments. Toutefois, demandez conseils à votre médecin ou votre pharmacien avant d'utiliser tout autre médicament, y compris les médicaments en vente libre, les vitamines et les produits de santé naturels.

Conservation

Mettre à l'abri de la chaleur, de l'humidité et de la lumière.

Gardez hors de la portée des enfants.

Stylo :

Conserver entre 2 et 8°C (au réfrigérateur). Après la première utilisation, conserver le stylo à température ambiante (à 25 °C ou moins), pendant 28 jours au maximum.

Fioles :

Conserver à température ambiante (à 25 °C ou moins). Après la première utilisation, conserver les fioles multidoses à température ambiante pendant 28 jours au maximum.