

Doxycycline - Capsule de 100 mg

Qu'est-ce que la doxycycline ?

La doxycycline est un antibiotique utilisé après le [prélèvement d'ovules](#) pour prévenir le risque d'infection au moment du [transfert d'embryon](#). Une infection pourrait compromettre une éventuelle grossesse.

Mode d'utilisation

Votre médecin vous prescrira une dose de 100 mg deux fois par jour pendant cinq jours, à débiter le lendemain du prélèvement d'ovules. Prenez votre traitement au complet.

Dose oubliée

En cas d'oubli, ne prenez pas de double dose. Prenez la dose dès que vous y pensez, sinon prenez la dose suivante à l'horaire habituel.

Effets secondaires et précautions d'emploi

La doxycycline peut entraîner des nausées, des vomissements, une baisse de l'appétit, de la diarrhée.

Prenez chaque dose debout ou assise, avec un grand verre d'eau. Vous pouvez prendre la doxycycline avec de la nourriture mais éviter les produits laitiers une heure avant et après la prise de doxycycline car la combinaison du calcium et de la doxycycline réduit l'absorption des deux agents.

Cet antibiotique rend votre peau plus sensible au soleil. Il n'est pas recommandé de vous exposer aux rayons du soleil de même qu'à toute forme de rayons ultraviolets (ex. salon de bronzage) durant le traitement. Appliquez un écran solaire d'indice de protection UV élevé (FPS50+).

Arrêtez le traitement et contactez votre médecin ou pharmacien en cas de réaction très forte au niveau de la peau.

Ne prenez pas ce médicaments si vous avez un antécédent d'allergie connue à la doxycycline ou aux tétracyclines et signalez le à votre médecin.

Signalez à votre médecin si vous avez des problèmes au niveau du foie, des reins ou des muscles.

Interactions médicamenteuses

Des interactions sont possibles avec d'autres médicaments. Demandez conseils à votre pharmacien ou à votre médecin avant de débiter tout autre médicament, y compris les médicaments en vente libre, les vitamines et les produits de santé naturels. Éviter les produits laitiers une heure avant et après la prise de doxycycline car la combinaison du calcium et de la doxycycline réduit l'absorption des deux agents.

Conservation

Conservez le médicament à température ambiante (maximum 25°C), à l'abri de la lumière, de la chaleur et de l'humidité, dans un emballage fermé hermétiquement.

Garder les médicaments hors de la portée des enfants.