

Bromocriptine (Parlodel) - comprimé de 2.5 mg et capsule de 5 mg

Qu'est-ce que la bromocriptine ?

La bromocriptine va permettre de diminuer vos taux de [prolactine](#) élevés, qui contribuent à vos troubles ovulatoires.

La prolactine est une hormone naturelle sécrétée par l'[hypophyse](#) (une glande située au niveau du cerveau).

La sécrétion exagérée de prolactine entraîne un blocage de votre [cycle menstruel](#).

Conseils d'utilisation

La dose de bromocriptine varie entre 2.5 et 15 mg par jour en fonction de votre réponse au traitement.

Les comprimés sont à avaler avec un verre d'eau, de préférence pendant un repas.

Ainsi l'augmentation de vos doses se fera progressivement, chaque semaine jusqu'à l'obtention de la réponse optimale.

La dose initiale est de 1.25 à 2.5 mg par jour. Les doses doivent être réparties deux à trois fois par jour, de préférence pendant les repas pour diminuer l'apparition de troubles digestifs.

Les dosages de vos taux de prolactine, chaque mois, permettrons le suivi de votre réponse au traitement.

Dose oubliée ou surdosage

Si vous oubliez de prendre une dose, prenez-la dès que possible, sauf si le temps est presque venu de prendre la prochaine dose. Dans ce cas, sautez la dose oubliée et prenez la dose suivante comme d'habitude. Ne prenez pas deux doses à la fois pour compenser celle que vous avez oubliée.

Respectez les doses prescrites par votre médecin. Si vous prenez trop de comprimés par mégarde, appelez votre médecin ou votre pharmacien.

Effets secondaires

Des chutes de tension et des vertiges sont possibles, en particulier au début du traitement. Par conséquent, nous vous conseillons d'être prudente si vous devez conduire votre véhicule.

Les maux de tête, les nausées, les crampes abdominales, la constipation ou la diarrhée font également partie des effets indésirables fréquents de la bromocriptine. S'ils vous incommode, en parler avec votre médecin à la prochaine visite.

Interactions et précautions d'emploi

Il existe des interactions entre la bromocriptine et d'autres médicaments dont certains médicaments utilisés pour traiter la migraine. Il existe également des interactions avec les produits de santé naturels et les médicaments sans ordonnance.

Avant de débiter tout autre médicament, y compris les médicaments en vente libre, les vitamines et les produits de santé naturels, demandez conseil à votre pharmacien ou à votre médecin.

Conservation

Conservez les comprimés ou capsules à température ambiante (maximum 25°C), à l'abri de la lumière, de la chaleur et de l'humidité, dans un contenant hermétique (si possible celui d'origine).

Gardez les médicaments hors de la portée des enfants.