

Hormone gonadotrophine chorionique (hCG)

Qu'est-ce que l'hormone gonadotrophine chorionique?

L'[hormone gonadotrophine chorionique \(hCG\)](#), est une hormone produite par le [placenta](#). Elle permet de contrôler le [déclenchement de l'ovulation](#).

L'[hCG](#) pour injection qui vous a été prescrite est issu de l'urine de femmes enceintes et a été purifié.

Mode d'utilisation

Ce médicament s'administre par injection **sous-cutanée et peut être administrée intra-musculaire**.

Vous devrez vous injecter une **dose unique d'hCG à date et heure précise**, selon le résultat de vos dosages hormonaux et des échographies effectuées. L'injection aura lieu **le soir**.

L'infirmière de la clinique vous enseignera comment préparer votre médicament et comment l'injecter.

Elle vous contactera également pour vous indiquer la dose ainsi que la date et l'heure précise où vous devrez vous administrer l'hCG.

Dose oubliée ou surdosage : Contactez votre professionnel de santé du CPMA

Si vous oubliez ou manquez la dose, contactez immédiatement l'infirmière de la clinique. Il se pourrait que vous deviez suspendre votre cycle et reprendre le traitement au cycle suivant.

En aucun cas vous ne devez doubler la dose sans que votre médecin ne vous l'ait précisé.

Effets secondaires

L'injection d'hCG est généralement bien tolérée. Vous pouvez présenter des maux de tête, des crampes abdominales, de la sensibilité des seins, des bouffées de chaleur, des nausées, un gonflement abdominal, une rougeur au site d'injection qui persiste en général 24 heures. Parlez-en à votre professionnel de la santé s'ils vous incommode.

Ce traitement peut rarement entraîner un [syndrome d'hyperstimulation ovarienne](#) (SHO). Afin de le prévenir, un suivi étroit sera effectué. Toutefois, il est important de reconnaître **les signes de gravité**. **Contactez d'urgence votre médecin si vous ressentez :**

-  **Douleur abdominale sévère.**
-  **Nausées, diarrhées, vomissements sévères.**
-  **Gain de poids rapide et augmentation importante du périmètre abdominal.**
-  **Essoufflement au repos ou difficultés respiratoire.**
-  **Diminution du volume des urines.**

Les grossesses multiples et la formation de kystes ovariens sont possibles. Un suivi échographique sera effectué afin de les prévenir.

Rarement, des caillots dans les jambes peuvent survenir. Si vous avez des antécédents personnels ou familiaux, des facteurs de risques connus, parlez-en à votre médecin.

Interactions

L'injection d'hCG ne présente pas d'interactions connues avec d'autres médicaments. Toutefois, demandez conseils à votre médecin ou votre pharmacien avant d'utiliser tout autre médicament, y compris les médicaments en vente libre, les vitamines et les produits de santé naturels.

Conservation

Mettre à l'abri de la chaleur, de l'humidité et de la lumière.

Gardez les médicaments hors de la portée des enfants.

Conserver la fiole contenant la poudre lyophilisée à température ambiante (à 25 °C ou moins).

Après la préparation avec le diluant, la solution doit être réfrigérée (entre 2 et 8°C) et utilisée dans les 30 jours.