

ADMINISTRATION D' IMMUNOGLOBULINE ANTI-D « WinRho »

OBJECTIF :

- ▶ Cette immunoglobuline inhibe le développement d'anticorps « anti-D » pendant la grossesse chez les femmes enceintes dont le groupe Rh est négatif et qui sont exposées au sang Rh positif de leur fœtus.

CONDITIONS :

- ▶ Vous n'avez pas besoin d'être à jeun pour ce test
- ▶ Par contre, si vous avez d'autres tests prescrits en même temps, vérifiez si vous devez être à jeun pour les autres tests.
- ▶ Une prise de sang est nécessaire avant l'administration de l'immunoglobuline anti-D
- ▶ L'immunoglobuline anti-D « WinRho » s'administre à la 28^{ème} semaine de grossesse ou selon les besoins médicaux

ACCUEIL :

- ▶ **Prendre un numéro** dès votre arrivée à l'accueil.
- ▶ **Veillez vous asseoir** sur les chaises dans la salle d'attente en face de l'accueil.
- ▶ **Veillez attendre** qu'on vous appelle **par votre numéro.**
- ▶ **Ayez en main** votre carte d'assurance maladie valide, votre carte d'hôpital valide ainsi que votre prescription médicale ou requête d'analyses de laboratoire dûment remplie.
- ▶ À l'appel de votre numéro, présentez-vous à l'accueil.

PRÉLÈVEMENT :

- ▶ Avant d'effectuer le prélèvement, la technologiste confirmera votre identité
- ▶ Une fois la prise de sang terminée, **vous devrez signer la requête de laboratoire « banque de sang »** afin de confirmer votre identité. La technologiste devra signer également en indiquant la date et l'heure du prélèvement.
- ▶ Prenez avec vous **votre prélèvement** contenu dans un sac scellé accompagné de la requête et dirigez-vous immédiatement à la réception des spécimens du laboratoire de « **banque sang** » situé au bout du corridor du bloc 2. Remettre le tout à la technologiste et attendre sur place.
- ▶ Après un moment d'attente, afin d'effectuer les analyses préalables requises, la technologiste vous remettra la fiole d'immunoglobuline à recevoir
- ▶ **Par la suite, vous devrez vous diriger au 4^e étage à l'unité d'obstétrique pour vous faire administrer le produit**
- ▶ Vous pourrez quitter l'hôpital peu de temps après l'administration du produit à la condition de vous sentir bien seulement

Approuvé par Jocelyne Cousineau, Ph D, biochimiste clinique 20 novembre 20011