

Létrozole (Femara)

Qu'est-ce que le létrozole?

Le létrozole stimule les [ovaires](#) à produire des [ovules](#) matures pour la [fécondation](#).

Le létrozole diminue la concentration en [œstrogènes](#) dans votre sang et augmente ainsi la libération de [FSH](#).

La [FSH](#) est une hormone sécrétée par l'[hypophyse](#), une glande située dans le cerveau. Elle participe au recrutement et à la maturation des [follicules](#) ovariens. Ce sont dans les follicules que se trouve(nt) le ou les ovules pour la [fécondation](#).

L'innocuité en induction de l'ovulation du létrozole est bien documentée dans la littérature scientifique. Sur plus de 1000 femmes traitées en début de cycle pour induire l'ovulation à des doses variant entre 2,5 et 7,5 mg par jour, pour cinq jours, la prise de létrozole n'a pas été associée à une augmentation du risque de malformation majeure. De plus, le létrozole est éliminé du corps avant l'implantation de l'embryon, ce qui évite l'exposition durant la période critique de formation des organes.

Mode d'utilisation

Prenez ce médicament toujours à la même heure chaque jour, avec ou sans aliments.

L'[ovulation](#) devrait survenir de 6 à 12 jours après la prise de votre dernier comprimé durant un cycle.

La dose de létrozole peut varier d'un cycle à l'autre selon la réponse au traitement. L'augmentation de dose nécessite un suivi étroit, n'augmentez pas la dose par vous-même.

Dose oubliée ou surdosage : Contactez votre professionnel de santé du CPA

Si vous oubliez ou manquez une dose, contactez immédiatement l'infirmière de la clinique. Il se pourrait que vous deviez suspendre votre cycle et reprendre le traitement au cycle suivant. En aucun cas vous ne devez doubler la dose sans que votre médecin ne vous l'ait prescrit.

Effets secondaires

Le létrozole est généralement bien toléré. Il se peut toutefois que vous ressentiez quelques effets indésirables, tels que des troubles gastro-intestinaux (par ex. des nausées, des vomissements, de la constipation, de la diarrhée), des maux de tête, des bouffées de chaleur et de la fatigue.

Ces effets sont généralement réversibles dans les quelques jours qui suivent le début du traitement. Si ces effets persistent ou vous gênent, signalez-les à votre professionnel de santé.

Interactions

Le létrozole ne présente pas d'interactions connues avec d'autres médicaments. Toutefois, demandez conseils à votre médecin ou votre pharmacien avant d'utiliser tout autre médicament, y compris les médicaments en vente libre, les vitamines et les produits de santé naturels.

Conservation

Conserver à température ambiante (maximum 25°C) à l'abri de la lumière, de la chaleur et de l'humidité dans des contenants fermés hermétiquement.

Gardez les médicaments hors de la portée des enfants.