

Instructions pour le prélèvement d'oxyures

RECHERCHE D'OXYURES (SCOTCH TAPE)

- ▶ Les oxyures (*Enterobius vermicularis*, ou pinworms en anglais) sont des petits parasites (vers) blancs.
- ▶ Pour faire le diagnostic, on utilise une spatule adhésive spéciale qu'on applique près de l'anus.
- ▶ Le meilleur moment pour obtenir un échantillon est tôt le matin au réveil de l'enfant, avant de se lever ou d'aller à la toilette.
- ▶ Le prélèvement peut également être fait quelques heures après que l'enfant se soit allongé soit entre 21h00 et minuit.
- ▶ Il est recommandé de prélever des échantillons sur trois à six jours consécutifs. On peut commencer par prélever 3 échantillons et les apporter au laboratoire. Par contre, il faut jusqu'à 6 prélèvements avant de pouvoir dire que l'enfant n'est pas infecté.

Étapes à suivre :

1. Tenir la spatule par le capuchon et la retirer du tube.
2. Écartier les fesses et presser fermement la surface collante en plusieurs endroits de la région périanale (autour de l'anus). Ne pas introduire la spatule dans l'anus.
3. Remettre la spatule dans le tube pour le transport jusqu'au laboratoire ; les échantillons doivent être **réfrigérés** en attendant d'être rapportés au laboratoire.
4. Bien se laver les mains par la suite

