




**CHU
Sainte-Justine**
Le centre hospitalier
universitaire mère-enfant
Université 
de Montréal

Injection sous-cutanée de Buséreline

Dépliant d'informations destiné aux patientes



Qu'est-ce que le Buséreline ?

Le Buséreline vous a été prescrit pour supprimer la sécrétion des hormones sexuelles et contrôler votre cycle ovarien. Il permet d'avoir une meilleure maturation de vos follicules.

Le Buséreline est parfois prescrit pour le déclenchement de l'ovulation dans certains protocoles en FIV.

Effets secondaires possibles

- Maux de tête (vous pouvez prendre de l'acétaminophène)
- Bouffées de chaleur
- Bouche sèche, peau sèche, sécheresse vaginale
- Diminution de la libido
- Humeur changeante
- Rougeur au site d'injection
- Maux de ventre

Procédure

Voici le lien vers la vidéo : *Procréation assistée : Médicaments*

<https://www.chusj.org/fr/soins-services/P/clinique-fertilite-procreation-assistee/Medicaments>



Étape 1

- Bien nettoyer la surface de travail et se laver les mains avec de l'eau et du savon.

Étape 2

MATÉRIEL :

- 1 fiole de Buséreline
- 1 seringue de 1 ml
- 1 aiguille pour prélever le médicament
- 1 aiguille pour injecter le médicament
- 2 tampons d'alcool
- Des mouchoirs en papier
- 1 contenant pour récupération des aiguilles utilisées

Étape 3

PRÉPARATION DU MÉDICAMENT

1. Enlever le capuchon de plastique de la fiole. Nettoyer la membrane de caoutchouc avec un tampon d'alcool et laisser sécher 30 secondes.
2. Vérifier l'apparence du liquide. Il doit être incolore et sans particule.
3. Prendre la seringue et visser dessus l'aiguille pour prélever le médicament.
4. Tirer sur le piston jusqu'au chiffre _____ pour aspirer de l'air.
5. Insérer l'aiguille dans la fiole et injecter cette quantité d'air dans la fiole.
6. Laisser l'aiguille insérée et retourner la fiole, bouchon vers le bas, puis ajuster le bout de l'aiguille pour qu'il soit immergé dans le liquide.
7. Aspirer la quantité requise du médicament en tirant sur le piston de la seringue jusqu'au chiffre_____.
8. Retourner la fiole, bouchon vers le haut, puis retirer l'aiguille et la seringue de la fiole.
9. Tenir la seringue avec l'aiguille orientée vers le haut, et tirer doucement sur le piston pour faire entrer l'air dans la seringue, puis pousser doucement sur le piston pour faire sortir les bulles d'air.
10. Remettre le bouchon sur l'aiguille, puis retirer l'aiguille de la seringue et la jeter dans le contenant pour récupération des aiguilles utilisées.
11. Visser l'aiguille pour injecter le médicament sur la seringue contenant le Buséreline.

Étape 4

ADMINISTRATION DU MÉDICAMENT

1. Nettoyer le site d'injection avec un tampon d'alcool du centre vers l'extérieur. Laisser sécher la peau 30 secondes.
2. Enlever le capuchon de l'aiguille.
3. Pincer la peau au site d'injection et tout en tenant la seringue comme si c'était un dard, enfoncer l'aiguille dans la peau d'un mouvement sûr et rapide.
4. Injecter la solution tranquillement. Il est possible d'avoir une légère sensation de brûlure.
5. Après avoir terminé l'injection, laisser l'aiguille en place environ 5 secondes avant de la retirer.
6. Appuyer avec un mouchoir propre sur le site d'injection.
7. Il est important de varier les sites d'injection.

CHU Sainte-Justine

3175, chemin de la Côte-Sainte-Catherine
Montréal (Québec) H3T 1C5
Téléphone : 514 345-4931

chusj.org

Conservation de la fiole

1. À la température de la pièce (25 °C ou moins).
2. À l'abri de la lumière, de la chaleur et de l'humidité, dans son contenant d'origine.
3. Vérifier la date de péremption avant la première utilisation.
4. Inscrive la date d'ouverture de la fiole lors de la première utilisation. La fiole se conservera au maximum 14 jours.



Révision

Marie-Sophie Brochet, pharmacienne
Sabrina Venne, infirmière clinicienne

Validation

Comité des documents destinés à la clientèle

Impression

Imprimerie du CHU Sainte-Justine
© CHU Sainte-Justine

F-1414 GRM 3000700 (rév. 06-2026)