

Département de pharmacie - secteur fabrication

Nom du produit : labetalol 40 mg/mL so fab (F)(G)

Format : 250 ml

Quantité : 1 bout

No produit : 360764

Stabilité 60 jour(s)

température pièce

Ingrédient, forme, dosage	Qté par unité	Qté totale
labetalol 100 mg co	100 co	100 co
++véhicule pour suspension orale (ORA-BLEND)	QS AD 250 ml	QS AD 250 ml
++magistrale catégorie UN HSJ	1	1

Information étiquette:

Conserver à la température de la pièce.

Agiter bien.

Mode de préparation :

- 1) Triturer les comprimés dans un mortier.
- 2) Mouiller la poudre avec une petite quantité d'Ora-Blend afin de former une pâte homogène et solubiliser l'enrobage.
- 3) Ajouter l'Ora-Blend par dilution géométrique et transvider dans un cylindre gradué.
- 4) Compléter au volume requis avec l'Ora-Blend.
- 5) Bien mélanger et embouteiller.

USAGES:

Antihypertenseur, bêta-bloquant avec activité alpha-bloquante

NOTES:

Ora-Blend = moitié Ora-Plus et moitié Ora-Sweet.

Recette originale avec un mélange moitié-moitié Ora-Plus et Ora-Sweet ou Ora-Sweet SF.

Stable également 60 jours au réfrigérateur.

Début d'utilisation en juin 2012.

Peut aussi être préparé avec de l'Ora-Sweet SF en remplacement de l'Ora-Sweet régulier.

L'étude utilisait des bouteilles ambrées.

RÉFÉRENCES:

Allen JC, Erickson MA. Stability of labetalol hydrochloride, metoprolol tartrate, verapamil hydrochloride, and spironolactone with hydrochlorothiazide in extemporaneously compounded oral liquids. Am J Health-Syst Pharm 1996;53:2304-9.

Labetalol hydrochloride 40 mg/ml Oral liquid. IJPC 1997;1(3):179.

Ordre des pharmaciens du Québec. Norme 2012.01 - Préparations magistrales non stériles en pharmacie. 82 p. [en ligne le 11 janvier 2012].

CONTRÔLE DE QUALITÉ ET APPARENCE:

Apparence: suspension orange, pâle, trouble

Publié sur le site internet du CHU Sainte-Justine en novembre 2020.