

Département de pharmacie - secteur fabrication

Nom du produit : Imatinib 40 mg/ml suspension (F)

Format : 60 ml

Quantité : 3 bout

No produit : 362526

Stabilité 14 jour(s)

température pièce

Ingrédient, forme, dosage	Qté par unité	Qté totale
imatinib 400 mg co (onc)	6 co	18 co
++véhicule pour suspension orale (ORA-SWEET)	QS AD 60 ml	QS AD 180 ml
++magistrale catégorie TROIS OPQ	3	9

Information étiquette:

Agiter bien.

Conserver à la température de la pièce.

Précautions NIOSH requises

Mode de préparation :

PRECAUTIONS NIOSH REQUISES

- 1) Triturer finement les comprimés d'Imatinib.
- 2) Tamiser la poudre pour en extraire la pellicule d'emballage.
- 3) Mouiller la poudre avec un peu d'Ora-Sweet et homogénéiser le mélange.
- 4) Ajouter géométriquement la quantité requise d'Ora-Sweet.
- 5) Compléter au volume avec l'Ora-Sweet.

USAGE:

Antinéoplasique

NOTES:

Le résultat final n'est pas optimal, laissant une apparence pâteuse.

L'emploi de l'Ora-Blend donnera un mélange encore pire, inacceptable pour les patients.

Stable également 14 jours au réfrigérateur.

L'étude utilisait des bouteilles ambrées.

RÉFÉRENCES:

Li Q, Liu Z, Kolli S, Wetz K, Griffith N, Poi, MJ. Stability of extemporaneous erlotinib, lapatinib, and imatinib oral suspensions. Am J Health-Syst Pharm 2016;13:1331-7.

Protocole de recherche, Children's Oncology Group. Document version 07/30/2019, version number 12.1

Ordre des pharmaciens du Québec. Norme 2012.01 - Préparations magistrales non stériles en pharmacie. 82 p. [en ligne le 11 janvier 2012].

CONTRÔLE DE QUALITÉ ET APPARENCE:

Apparence: suspension grumeleuse.

Publié sur le site internet du CHU Sainte-Justine en novembre 2020.