

Département de pharmacie - secteur fabrication

Nom du produit : nitrofurantoïne 10 mg/mL so fab (F)(G)

Format : 100 ml

Quantité : 3 bout

No produit : 361352

Stabilité 91 jour(s)

température pièce

Ingrédient, forme, dosage	Qté par unité	Qté totale
nitrofurantoïne 50 mg caps	20 caps	60 caps
nitrofurantoïne 50 mg co	20 co	60 co
++véhicule pour suspension orale (ORA-BLEND)	QS AD 100 ml	QS AD 300 ml
++magistrale catégorie UN HSJ	1	3

Information étiquette:

Conserver à la température de la pièce.

Agiter bien.

Mode de préparation :

ATTENTION: UTILISER LES COMPRIMÉS OU LES CAPSULES MAIS PAS LES DEUX. SELON DISPONIBILITÉ:

- 1) Triturer les comprimés dans un mortier OU ouvrir les capsules et en triturer la poudre dans un mortier.
- 2) Mouiller la poudre avec un peu d'Ora-Blend afin de former une pâte.
- 3) Ajouter le reste de l'Ora-Blend par dilution géométrique et transvider dans un cylindre gradué.
- 4) Compléter au volume requis avec l'Ora-Blend et bien mélanger.

USAGES:

Antibiotique

NOTES:

ATTENTION: Ne pas utiliser les capsules de Macrobid mais celles de Macrochantin.

Note: Ora-Blend = moitié Ora-Plus et moitié Ora-Sweet.

Étude réalisée en bouteille ambrée.

La stabilité de 91 jours est valide à température pièce et réfrigéré.

Passage à l'Ora-Blend en décembre 2009.

Ajout de la possibilité d'utiliser les capsules en juillet 2016 suite à une pénurie de comprimés. La compagnie TEVA n'a pu fournir aucune contre-indication à cette substitution.

RÉFÉRENCES:

Ensom MHH, Decarie D. Stability of Nitrofurantoin in extemporaneously compounded suspensions. Can J Hosp Pharm 2006;59:29-33.

Lettre de TEVA Canada à Hélène Roy en date du 14 juin 2016..

Ordre des pharmaciens du Québec. Norme 2012.01 - Préparations magistrales non stériles en pharmacie. 82 p. [en ligne le 11 janvier 2012].

CONTRÔLE DE QUALITÉ ET APPARENCE:

Apparence: suspension jaune, opaque

Publié sur le site internet du CHU Sainte-Justine en novembre 2020.