

Département de pharmacie - secteur fabrication

Nom du produit : rifaximin 20 mg/ml suspension orale (F)

Format : 110 ml

Quantité : 3 bout

No produit : 362113

Stabilité 60 jour(s)

température pièce

Ingrédient, forme, dosage	Qté par unité	Qté totale
rifAXIMine 550 mg co	4 co	12 co
++véhicule pour suspension orale (ORA-BLEND)	QS AD 110 ml	QS AD 330 ml
++magistrale catégorie UN HSJ	1	3

Information étiquette:

Conserver à la température de la pièce.

Agiter bien.

Mode de préparation :

- 1) Triturer les comprimés dans un mortier.
- 2) Mouiller la poudre avec un peu d'Ora-Blend afin de former une pâte.
- 3) Ajouter le reste de l'Ora-Blend par dilution géométrique et compléter au volume requis.
- 4) Bien mélanger.

USAGES:

Antibiotique

NOTES:

Note: Ora-Blend = moitié Ora-Plus et moitié Ora-Sweet.

L'étude est réalisée en bouteille de plastique ambrée.

Aucune donnée disponible pour la réfrigération.

L'Ora-Blend SF peut également être utilisé pour cette formulation.

RÉFÉRENCE:

Cober MP, Johnson CE, Lee J, Currie K. Stability of extemporaneously prepared rifaximin oral suspensions. Am J Health-Syst Pharm 2010;67:287-9.

Ordre des pharmaciens du Québec. Norme 2012.01 - Préparations magistrales non stériles en pharmacie. 82 p. [en ligne le 11 janvier 2012].

CONTRÔLE DE QUALITÉ ET APPARENCE:

Suspension orange opaque.

Publié sur le site internet du CHU Sainte-Justine en novembre 2020.