

# TEST AU XYLOSE

## OBJECTIF

- Le test au xylose permet de vérifier l'absorption intestinale
- Le xylose est un sucre que l'organisme ne fabrique pas.
- Vous devez prendre **rendez-vous** au Centre de Prélèvements (514) 345-4650

## PRÉPARATION

- Le patient doit être **à jeun** depuis minuit. Aucun breuvage, ni eau et aucune nourriture.
- Chez un bébé, un jeûne de 4 heures est suffisant.
- La technologiste aura besoin du poids et de la taille de l'enfant.

## ACCUEIL :

- **Prendre un numéro** dès votre arrivée à l'accueil.
- **Veillez vous asseoir** sur les chaises dans la salle d'attente en face de l'accueil.
- **Veillez attendre** qu'on vous appelle **par votre numéro**.
- **Ayez en main** votre carte d'assurance maladie valide, votre carte d'hôpital valide ainsi que votre prescription médicale ou requête d'analyses de laboratoire dûment remplie.
- À l'appel de votre numéro, présentez-vous à l'accueil
- Une fois l'inscription terminée, veuillez attendre dans la salle d'attente numéro 3 jusqu'à qu'une technologiste vous appelle par votre nom et prénom et vous indique une salle de prélèvements.

## DÉROULEMENT DU TEST :

- La quantité de la solution de xylose sera mesurée selon le poids et la taille de votre enfant.
- L'enfant devra boire le plus rapidement possible la solution de xylose
- Si l'enfant refuse de boire ou s'il vomit, le test est annulé et le médecin requérant sera avisé.
- Un prélèvement sanguin sera effectué exactement **1 heure** après l'ingestion de xylose
- Vous pourrez quitter le Centre de Prélèvement après le prélèvement sanguin.
- Les résultats seront communiqués à votre médecin.

Approuvé par Jocelyne Cousineau, Ph D, biochimiste clinique 20 novembre 20011