



**CHU
Sainte-Justine**
Le centre hospitalier
universitaire mère-enfant

Université 
de Montréal

Hystéro- salpingographie

Informations destinées
à la clientèle



Qu'est-ce qu'une hystérosalpingographie ?

Une hystérosalpingographie (HSG) est un examen radiologique qui permet de visualiser la cavité de l'utérus et la perméabilité des trompes utérines. L'examen permet de dépister certaines anomalies susceptibles d'entraîner une infertilité partielle ou totale. L'hystérosalpingographie consiste à introduire dans la cavité utérine (par le vagin) un produit opaque aux rayons X (un colorant) et à prendre plusieurs clichés radiologiques.

La consultation dure environ 30 minutes, mais l'examen proprement dit ne dure qu'environ 10 minutes.

Cet examen est réalisé en imagerie médicale. Vous pourrez retourner au travail dans l'heure qui suit.

Quand fait-on cet examen ?

L'examen est pratiqué dans la première partie du cycle menstruel (entre le cinquième et le douzième jour du cycle).



Consignes à suivre le jour de l'examen

- ▶ Prenez un repas avant l'examen.
- ▶ L'hystérosalpingographie est contre-indiquée si vous êtes enceinte. Pour cette raison, il est important de faire un test de grossesse urinaire avant l'examen. Les informations nécessaires vous seront transmises par votre infirmière.
- ▶ **Prenez 2 comprimés analgésiques tels que Advil^{MD} ou Motrin^{MD} 1 heure avant l'examen (important).**
- ▶ Apportez votre carte d'assurance maladie et votre carte d'hôpital.
- ▶ Présentez-vous à l'accueil de l'imagerie médicale au 1^{er} étage, bloc 11, à l'heure indiquée.
- ▶ Videz votre vessie avant l'examen.
- ▶ N'oubliez pas d'apporter un protège-dessous.

Effets secondaires possibles

- ▶ De légers saignements vaginaux peuvent survenir dans les heures qui suivent l'examen. Il est aussi normal d'avoir des écoulements vaginaux collants et épais : ce sont les résidus du produit opaque utilisé.
- ▶ Il est aussi possible de ressentir des douleurs abdominales ressemblant aux crampes menstruelles. Vous pouvez prendre des comprimés analgésiques (p. ex. : comprimés d'Advil^{MD} ou de Motrin^{MD}) pour soulager cette douleur.

CHU Sainte-Justine

3175, chemin de la Côte-Sainte-Catherine

Montréal (Québec) H3T 1C5

Telephone : 514 345-4931

chusj.org

Si, dans les 24 ou 48 heures suivant l'examen, vous présentez un des symptômes suivants :

- ▶ De la fièvre (plus de 38,0 degrés Celsius).
- ▶ Des pertes vaginales nauséabondes (qui sentent mauvais).
- ▶ Des douleurs abdominales qui vous empêchent de dormir et qui ne sont pas soulagées par la prise régulière de comprimés analgésiques (2 comprimés d'Advil^{MD} ou de Motrin^{MD} aux 4 heures).

Contactez le CPA au 514 345-4883 ou présentez-vous à l'urgence gynécologique située au 4^e étage, bloc 11, les soirs ou les fins de semaine.

Révision

Équipe CPA et Véronique Pelchat, CSI, novembre 2021

Suzanne Provencher, inf. clin., juin 2017

Anne-Marie Morand, CSI, juin 2013

Impression

Imprimerie du CHU Sainte-Justine

© CHU Sainte-Justine

Comité des documents destinés à la clientèle

F-1416 GRM 30007008 (Rév. 11-2021)