

Préparation et injection intra-musculaire (IM) de SOLU-CORTEF^{MD} en situation d'urgence

La dose de ▶

(Nom de l'enfant)

est de ▶

_____ mg, soit _____ ml.

Matériel

- fiole de 100 mg/2ml
- seringue stérile de 3 ml
- aiguille stérile #23G/1 pouce
- tampon d'alcool, ouate
- pansement adhésif au besoin

Afin de prévenir les infections, laver soigneusement vos mains à l'eau et au savon avant de préparer l'injection. Installez-vous sur une surface propre.

Préparation SOLU-CORTEF^{MD} IM


1. Appuyer fermement sur le bouchon jaune de la fiole afin que le diluant qui se situe dans la partie supérieure descende dans la partie inférieure. Agiter doucement afin de bien mélanger le diluant et la poudre. Assurez-vous que la solution est claire.
2. Sortir la seringue et l'aiguille de son emballage. Si nécessaire, fixer l'aiguille à la seringue.
3. Enlever, sur le dessus de la fiole, la petite pastille de plastique jaune recouvrant le centre du bouchon.
4. Désinfecter le bouchon de caoutchouc avec le tampon d'alcool.
5. Enlever le capuchon recouvrant l'aiguille et le mettre de côté.
6. Tirer le piston de la seringue jusqu'à ce que le volume d'air introduit dans celle-ci soit égal à la quantité de Solu-Cortef^{MD} prescrite par votre médecin, soit _____ ml.
7. Insérer l'aiguille directement dans le centre du bouchon de caoutchouc et pousser le piston lentement afin de faire pénétrer l'air dans la fiole.
8. Renverser la fiole. Assurez-vous que le bout de l'aiguille est dans la solution. D'une main, tenir la fiole et de l'autre main, tirer **lente-ment** le piston de la seringue jusqu'à ce que vous ayez la bonne quantité de Solu-Cortef^{MD}.
9. Tapoter délicatement la seringue si vous notez la présence de bulles d'air. Celles-ci remonteront vers le haut de la seringue et vous pourrez les repousser dans la fiole en appuyant doucement sur le piston. Assurez-vous d'avoir dans la seringue la quantité exacte de Solu-Cortef^{MD} prescrite par votre médecin, soit _____ ml. Sinon, réajuster à la quantité désirée.
10. Retirer l'aiguille de la fiole et remettre le capuchon protecteur sur l'aiguille.

*NB : Vérifier **régulièrement** la date d'expiration indiquée sur l'étiquette de la fiole du Solu-Cortef^{MD}. Au besoin, ne pas oublier de le faire représcrire auprès de votre endocrinologue au moment d'une visite médicale.*

Conserver la fiole de Solu-Cortef^{MD} à la température de la pièce (15 à 30° C). Garder hors de la portée des enfants.

Injection intra-musculaire (IM) de SOLU-CORTEF^{MD}

1. Installer l'enfant en position assise ou couchée sur le dos.
2. Vérifier, de nouveau, si la seringue contient la bonne quantité de Solu-Cortef^{MD}, soit _____ ml.
3. Désinfecter la peau de la cuisse avec le tampon d'alcool en partant du point d'injection et en agrandissant d'un mouvement circulaire. Ne pas revenir sur vos pas. Laisser sécher l'alcool avant de faire l'injection. Ne pas souffler.
4. Prendre la seringue avec le pouce et l'index, comme un crayon. Retirer le capuchon protecteur de l'aiguille.
5. Pincer le muscle de la cuisse entre vos doigts. Faire pénétrer rapidement l'aiguille dans le muscle à un angle de 90°. L'injection sera moins douloureuse si vous insérez l'aiguille rapidement.
6. Injecter lentement le médicament (en quelques secondes) en poussant doucement sur le piston jusqu'à ce que la seringue soit vide. Compter jusqu'à cinq, relâcher la peau et retirer doucement l'aiguille. Appliquer une pression sur le point d'injection avec une ouate sèche. Au besoin, appliquer un diachylon au niveau du point d'injection.
7. Jeter le matériel dans un contenant sécuritaire, non perforable. Ne pas remettre le capuchon en place. Ne pas plier ou casser l'aiguille.



Si votre enfant est malade et qu'il a besoin d'une injection IM de Solu-Cortef^{MD}, il aura probablement besoin d'autres soins médicaux. Amener immédiatement votre enfant à l'hôpital pour évaluation et traitement et présenter la lettre à remettre aux professionnels de la santé insérée dans ce document. Lorsque votre enfant reçoit son congé de l'hôpital, assurez-vous d'avoir en votre possession une nouvelle prescription de Solu-Cortef^{MD}. Si nécessaire, communiquer avec le service d'endocrinologie au 514 345-4735 du lundi au vendredi, de 8h00 à 17h00. En soirée et les fins de semaine, téléphoner au numéro suivant : 514 345-4788 et demander à parler à l'endocrinologue de garde.

CHU Sainte-Justine
3175, chemin de la Côte-Sainte-Catherine
Montréal (Québec) H3T 1C5
Téléphone : 514 345-4931

www.chu-sainte-justine.org

**EN CAS D'ÉVANOUISSEMENT OU TOUTE AUTRE URGENCE
MÉDICALE GRAVE, DONNER IMMÉDIATEMENT L'INJECTION IM
DESOLU-CORTEF^{MD} ET TÉLÉPHONER AU 911.**

Révision janvier 2014 par Carole Bélanger, *inf. clinicienne/équipe d'endocrinologie*

Graphisme

Norman Hogue, *communications et affaires publiques*

Impression

Imprimerie du CHU Sainte-Justine

© CHU Sainte-Justine

F-2080 GRM 7787 (rév. 08-2014)