

# Comment faire le pansement Bactigras-Polysporin à domicile?

CHU Sainte Justine  
Clinique de plastie

Alexandra Moraru, inf. clin.

Dre. Sabrina Cugno, chirurgienne plasticienne

Septembre, 2018

● Le pansement Bactigras est une compresse tissée de gaze imprégnée de vaseline contenant 0,5% d'acétate de Chlorhexidine.

● Utilisation du Bactigras:

- Plaies infectées ou à risque d'infection.
- Brûlures mineures.
- Site donneur de greffe.
- Lacérations, abrasions.



- Médication contre la douleur au besoin.
- Bactigras.
- Onguent antibiotique Polysporin.
- Compresses sèches.
- Rouleau Kling.
- Tampons d'alcool.
- Ciseaux propres.
- NaCl 0.9% (ou eau claire du robinet).
- Hypafix.





- ✓ Surface de travail propre;
  - ✓ Lavage des mains;
  - ✓ Matériel préparé et ouvert;
- Vous êtes prêt à faire le pansement à domicile!



- Au besoin, administrer la médication contre la douleur 1-2 heures avant la procédure;
- Commencer par retirer le pansement en place. Si trop adhérent, le faire tremper dans l'eau tiède savonneuse. Ça vous aidera à l'enlever sans trop d'inconfort pour l'enfant. À la fin, rincer la plaie à l'eau claire du robinet ou utiliser une solution saline NaCl 0.9%;



- Avec des ciseaux nettoyés à l'alcool, couper le Bactigras selon les dimensions de la plaie (garder le restant au frigo dans son emballage et fermé dans un sac en plastic x 7 jours après l'ouverture);

○Retirer la première pellicule en papier qui protège la compresse de Bactigras.

○Appliquer l'onguent Polysporin directement sur la compresse de Bactigras.

○Retirer la deuxième pellicule en papier;

○Une fois la plaie sèche, couvrir avec le Bactigras, côté Polysporin sur la plaie.

○Appliquer une compresse propre et rouler le bandage Kling (sans trop serrer).

○À la fin, coller le pansement à la peau avec Hypafix.





- Garder le pansement propre et sec;
- Au besoin, protéger le pansement avec des mitaines/bas (pour les plaies au niveau des mains/pieds);
- Surveiller les signes d'infection: douleur intense, fièvre, odeur nauséabond, écoulement jaune-verdâtre;
- Surveiller si saignement au niveau de la plaie;
- Si recommandé par le médecin, changer le pansement tel que prescrit et au besoin si pansement souillé, mouillé ou défait.



- Le changement de pansement peut être une source de douleur chez l'enfant. Prévoir donner de la médication contre la douleur 1-2 heures avant la procédure.

Quelques recommandations  
à suivre

## ○ Quand consulter?

- Si signes d'infection: douleur intense, fièvre, odeur nauséabond, écoulement jaune-verdâtre;
- Si saignement au niveau de la plaie.

## ○ Au besoin, qui contacter?

**Lundi au vendredi entre 8h-15h,**  
contacter l'infirmière à la clinique de plastie  
**514 345-4931 # 3444**

**Soirée ou fin de semaine,**  
contacter le plasticien de garde  
**514 345-4788**  
ou se présenter à l'urgence.

