

**Acheminer immédiatement au laboratoire!**

Prélèvement demandé: Date: \_\_\_\_\_ Heure \_\_\_\_\_ ou Heure de tournée: 7h  11h  14h  17h  20h  00h

Centre hospitalier : _____ Adresse : <u>Numéro civique</u> <u>Rue</u> <u>Municipalité</u> <u>Pays/Province</u> <u>Code postal</u> Téléphone : _____ FAX : _____ MD requérant : _____ # Licence : _____ <b>Prélèvement fait: Date:</b> _____ <b>Heure</b> _____ <b>Prélevé par:</b> _____ Cocher obligatoirement la nature de l'échantillon et les analyses requises Poids du jour : _____ kg    Taille du jour : _____ cm SANG : <input type="checkbox"/> CAPILLAIRE <input type="checkbox"/> CORDON OMBILICAL <input type="checkbox"/> VEINEUX <input type="checkbox"/> ARTÉRIEL <input type="checkbox"/> URINE <input type="checkbox"/> SELLES <input type="checkbox"/> AUTRE : _____	Identification du patient Nom, Prénom: _____ Sexe : F <input type="checkbox"/> M <input type="checkbox"/> # Dossier ou # Ass. maladie : _____ Date de naissance : _____ ou Plaquer carte d'identification : _____
---	---

Renseignements cliniques : \_\_\_\_\_  Rejet     Infection     Diarrhée     GVH digestive

**PHARMACOCINÉTIQUE (aire sous la courbe / AUC) : GANCICLOVIR**

*Tube lavande EDTA micro ou macro*

Administration des dernières doses : BID  TID

Date : \_\_\_\_\_ Heure : \_\_\_\_\_ Dose : \_\_\_\_\_ mg  
                   année-mois-jour    Heure : \_\_\_\_\_ Dose : \_\_\_\_\_ mg  
   Heure : \_\_\_\_\_ Dose : \_\_\_\_\_ mg

Voie d'administration :

- Périphérique  
 PAC : \_\_\_\_\_  
 PICC line voie : \_\_\_\_\_  
 Broviac voie : \_\_\_\_\_  
 Autre : \_\_\_\_\_

**Administration le jour de la pharmacocinétique**

Date : \_\_\_\_\_ Début perfusion : \_\_\_\_\_ h    Fin perfusion : \_\_\_\_\_ h    Dose : \_\_\_\_\_ mg  
                   année-mois-jour

**Toujours faire les prélèvements par une voie différente de la voie d'administration du médicament**

	BID	TID	Temps de prélèvement	Heure prévue <sup>1</sup>	Heure effectuée	Voie de prélèvement	Signature
COMPLÈTE	0	0	- 5 min (pré-infusion)				
	1	1	fin de l'infusion				
	2	2	30 min (post-infusion)				
	3	3	4 h (post-infusion)				
	4	4	6 h (post-infusion)				
	5		8 h (post-infusion)				
	6		11 h (post-infusion)				

(1) L'heure prévue des prélèvements est ajustée en fonction de l'heure précise de fin d'infusion.

**Procédure**

- Pour les prélèvements :**
- Prélever minimum 0,8 mL de sang sur un tube lavande **EDTA** micro ou macro.
  - **Bien identifier chaque tube** en incluant le temps réel de prélèvement.
  - **Placer le tube IMMÉDIATEMENT** dans un sac de transport des matériaux biologiques et acheminer le tout au Laboratoire Central dans l'heure suivant le prélèvement.

- Pour le laboratoire :**
- Centrifuger et décanter le plasma en ayant pris soin d'identifier correctement au préalable le tube de décantation.
  - Envoyer ensuite ce tube sur glace sèche.