

CHU Sainte-Justine

3175, chemin de la Côte-Sainte-Catherine
Montréal (Québec) H3T 1C5
Téléphone : 514 345-4931

www.chusj.org



Clinique de chirurgie pédiatrique

**Conseils pour le retour
à domicile après une
circoncision du nouveau-né**

Document destiné aux parents

Vous pouvez communiquer avec nous :

Du lundi au vendredi de 8 h à 16 h au
514 345-4879 ou au **514 345-4915**
Après 16 h et les fins de semaine au
514 345-4931, poste 0

Chirurgie pédiatrique

D^r Mona Beaunoyer, chef
D^r Ann Aspirot
D^r Marianne Beaudin
D^r Sarah Bouchard
D^r Michel Lallier
D^r Nelson Piché
D^r Dickens St-Vil

Rédaction :

Lucie Ferland, infirmière clinicienne, en collaboration avec Sylvie Carrière,
infirmière clinicienne

Réédition :

Josée Lamarche, cadre conseil en sciences infirmières, août 2015

Impression :

Imprimerie du CHU Sainte-Justine

© CHU Sainte-Justine

F-2722 GRM : 30008923 (REV.09-2015)



Conseils pour le retour à domicile après une circoncision du nouveau-né

Votre enfant vient de subir une circoncision à la cloche (anneau de plastique). Dans ce feuillet, vous trouverez des informations destinées à faciliter votre retour à la maison après la chirurgie.

Les premières 24 heures

- Le pansement doit être enlevé dès le premier changement de couche. Il est normal que la compresse soit teintée de sang.

Si le saignement persiste (goutte à goutte)

Prendre le pénis dans votre main avec une débarbouillette sèche et exercer une pression pendant 5 minutes. Par la suite, si le saignement persiste, vous devez vous présenter à l'**URGENCE DU CHU SAINTE-JUSTINE**.

- Vous pouvez nettoyer le pénis avec une serviette humide ou une lingette sans alcool. Appliquer de la Vaseline^{MD} sur le bout du pénis après chaque changement de couche.
- Il est recommandé de ne pas donner de bain durant les premières 24 heures, à moins qu'il y ait des selles sur le pénis.
- Afin de diminuer la douleur, il est recommandé de donner _____ ml de Tempra^{MD} ou Tyleno^{MD} (80mg/ml) toutes les 4 à 6 heures pendant 24/48 heures.

Après 24 heures

- Vous devez donner à votre nouveau-né un bain d'une durée de 5 à 10 minutes dans une eau tiède, 3 fois par jour, ou dès qu'il y a des selles sur le pénis. Terminer le bain en le lavant avec un savon doux et en l'asséchant avec une serviette.

- Vous devez poursuivre l'application de Vaseline^{MD} après chaque changement de couche, et ce, jusqu'à ce que l'anneau soit tombé. L'anneau de plastique et le fil tomberont d'eux-mêmes entre 5 à 10 jours après l'intervention. Si l'anneau tombe avant 5 jours et qu'il n'y a pas de saignement, ne vous inquiétez pas. Si l'anneau n'est pas tombé au bout de 10 jours, veuillez nous contacter pour prendre rendez-vous ou nous faire part de vos questions.
- Il est normal que le pénis soit enflé et rouge pendant quelques jours et que des sécrétions blanches ou jaunâtres apparaissent entre l'anneau et le gland. Continuer à lui donner le bain 3 fois par jour jusqu'à ce que l'anneau soit tombé.

Suite à la circoncision il faut savoir que :

- La circoncision n'entraîne pas de fièvre chez l'enfant.
- Après l'intervention, votre enfant urînera normalement.
- Vous pouvez prendre votre enfant dans vos bras comme à l'habitude sans craindre de lui faire mal.
- Vous devez bien attacher votre enfant dans son siège d'auto.
- Vous pouvez alimenter votre bébé immédiatement après la circoncision.